


## 6VC – Qihai



### Localisation

Sur la ligne médiane du bas abdomen, 1,5 *cun* en dessous de l'ombilic et 3,5 *cun* au-dessus du bord supérieur de la symphyse pubienne.

### Comment le trouver

On divise en 5 unités proportionnelles la distance qui sépare le centre de l'ombilic et le bord supérieur de la symphyse pubienne, distance qui peut varier considérablement d'une personne à l'autre si on la mesure avec le *cun* du doigt ; c'est pourquoi il est préférable de s'en tenir aux unités proportionnelles en *cun* (aide utile : ruban élastique, →2.3.1). Localiser RM-6 sur la ligne médiane antérieure, 1,5 *cun* en dessous de l'ombilic et 3,5 *cun* au-dessus du bord supérieur de la symphyse pubienne.

### Note :

En médecine chinoise, les mesures afférent au corps sont traditionnellement effectuées en *cun*. Le *cun* utilisé dans un contexte médical est une unité de mesure proportionnelle qui prend en compte les mesures individuelles de chacun. L'unité relative de mesure qu'est le *cun* se définit soit en utilisant la largeur d'un doigt précis ou de plusieurs doigts de la personne (*cun* du doigt) ou la distance entre deux repères clairement définis sur le corps (*cun* du corps). Le *cun* du corps ou *cun* proportionnel repose sur les proportions de zones particulières du corps que l'on divise en un nombre spécifique d'unités

### Source :

Ce texte et cette image sont des extraits, tirés de l'Atlas d'acupuncture, de Claudia Focks.

Focks, C. 2009. Atlas d'acupuncture, Edition Elsevier, 738 pages